

PRUEBA DE LA CLONIDINA

¿CÓMO DEBE PREPARARSE EL PACIENTE?

El paciente acudirá, a la hora a la que haya sido citado, a la Unidad de Pruebas Funcionales del Hospital Universitario de Getafe, ubicada en el pasillo morado de la planta baja del edificio principal. Ayuno mínimo de unas 4 a 6 horas y reposo la noche anterior.

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA PRUEBA?

La duración total de la prueba será de unas 2 horas y media.

- ✓ El paciente debe permanecer en reposo 30 min., tras lo cual se le realizará una extracción de sangre basal para la determinación de GH.
- ✓ A continuación se le administrará Clonidina por vía oral.
- ✓ Se extraerán muestras a los 60, 90 y 120 min.

Durante la prueba se medirá la tensión arterial en varias ocasiones.

¿QUÉ PUEDE NOTAR DURANTE LA PRUEBA?

La administración de clonidina puede provocar sueño (se mantendrá al niño tumbado durante la realización de la prueba), mareo, hipotensión arterial, hipoglucemia, convulsiones.

¿QUÉ TIENE QUE HACER DESPUÉS DE LA PRUEBA?

Tras finalizar es recomendable permanecer en reposo, debido a que la hipotensión puede permanecer un tiempo después de terminar el procedimiento.



Si tiene alguna duda, consulte al personal de la Unidad

Más información en labgetafe.com

